




ДК ЕКСЕПШЪН

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗРЯЛОСТ	СРЕДНОРАННА
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА	СРЕДНА
ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО	ОТЛИЧНА
МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ	МНОГО ДОБРО
УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА	МНОГО ДОБРА

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.



СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните получени от нашите опитни и производствени парцели.



УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Способността на хибрида да развива генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите на добив и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса, дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



ДВОЙНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФОМА

Комбинацията от Rlm7 ген и полигенна резистентност осигуряват изключителна и трайна устойчивост на фома и гъвкавост при използването на фунгициди.



ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА


Оптимизирането на вложенията е от ключово значение за фермерите. Хибридите DEKALB® достигат своя максимален добивен потенциал без значение дали количествата азот в почвата са оптимални или ограничени.



ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



* През 2022 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само със стандартно третиране (с фунгицид Scenic® Gold).

ПРЕПОРЪКИ

- Гъстота на посева: 35-45 растения/м².
- Висок добив, дори когато съдържанието на азот в почвата е ограничено (в случаите, когато употребата на торове е забранена от закона или в резултат на метеорологичните условия).
- Давайки тази характеристика, ние не препоръчваме намаляване на торовата норма за хектар.
- Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.
- При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.